

QVÆSTIO MEDICA

QVODLIBETARIIS DISPUTATIONIBVS. MANE. DISCVTIENDA

IN SCHOLIS MEDICORVM DIE IOVIS XI. DECEMBRIS.

M. PETRO HOMMETZ Doctore Medico, Moderatore.

An Peripneumonia amula Pleuritidis?

769



VAM retum quarundam potens sit in alias imperium, & quam indissolubilis aliarum nexus & societas, non modo partium totius Vniuersi inter se assensus & mutua *οὐκ ἀλλοτρίωσις*, sed earum præscriptum in nobis ad vtrancque sortem initium fecus ac solemnis conspiratio testatur. Thorax quidem respirationis, operis merè animalis organum, cuius priuatione, *ἀσπνοια* intelligo, nunquam vita superest, vix vno & simplice, nullo aut leui aut exiguo malo conficiatur: quippe qui infra supraque se positis visceribus, si quando nimis bene habuerint, premitur ac percellitur, vnaque cum his in ægri perniciem conspirat. Hydrops accessione tussis fit lethalis. Neque minus prauum est, si *κατὰ τὴν* & sternutamenta morbos pulmonum antecedit: ut & sequantur, quod alioqui in cæteris ferè salutare. Partium enim medio ventre contentarum viciniâ, officij societate, viarum & meatuum communione implicitos sibi quæ mutuo succedentes, tam *συνεχόμενοι*, quam *ἐνσυνεχόμενοι* semper calamitosa, paritur affectus: quodque magis mirum est, cum auribus dolet, cum genitalibus afficitur. Angina scilicet peripneumoniam excipit: hæc non ita abscessum. Namque corruptelæ, exulcerationis, hydrops (non minus in thorace quam in abdomine & vtero lethalis) metum adfert. Pleuritidis in peripneumoniam mutatio periculosa: peripneumonia in pleuritidem nulla *μεταστροφή*. Hanc tamen illa sepiusculè symptomatum planè similitudinem partis affectæ & humoris morbifici naturam consequentium concursu, tam ingeniosè imitatur & ementitur, vt falso pleuriticus ex inflammatione lateris credatur & curetur æger, qui tandem obfusa & euicta phlegmone pulmonum substantiâ, non recedentibus dolentis pleuritæ in dicijs, verè peripneumonius occumbit.



ARTIVM spirabilem ægrè affectarum communia symptomata sunt tussis & *ἀσπνοια*. Illa quos efficit fouetque thoracis morbos, eisdem curat: huius patens intemperies quævis, nuda vel cum materia. Vetus & sicca tussis cum rauitate *φθίσις* semper immediabilem portendit. Crebra & velox sine febre spiratio, quæ adiundum habet *μεταίωσις πνεύματος* in diuturnâ pulmonum ægritudine, asthma argumentum est, cui febris superueniens perniciofa. Hanc gignit pulmonum refectio, & aquarum aut puris in thorace *συνδρομήσις*, qui cum assiduâ viurum infirmitate suffocationem & interitum parit, vt & *οὐκ ὀρεγνόμενα* alpera aut leuis pulmonum artiaz, quod sine stertore, sed pulsu inæquali perseverante ægrum excrens, cordis palitationem, tandem & synocem interparabilem profert. Quamquam frequentius ortum habet a vasorum plenitudine, quam venæ sectio soluit: aut bronchiorum obstructione a crasso, lento, viscidò quæ humore spiritus vias tuas stertore occultente, cui *ἀσπνοια* profunt calida sicca medicamenta. Tussiculoso & anheloso affectus fouet, statisque periodicis excitat & acerbioribus facit perennis in capite aut vicinis partibus humoris tenuis ac ferè decubitus in pulmones, qui seniores ad mortem, vique comitatur, iuniores ac viros magis & sepius quam mulieres periculosè fatigat, vt & pulmonis ac pleuritæ inflammatio, in qua breuem, angustum, aut cum *ὀξυπνοια* spiritum ducere doloris acerbitas cogit. Vtri que supercipientis, licet a dauidico periculo, delirium, magnam & *ὀξυπνοια* *κατὰ τὴν* respirationem facit.



LEVITIS ab inflammatione sytrophicâ membranæ costas succingentis & musculorum intercostalium rariùs contingit, ob membranæ *ἀσπνοια*. Frequentior illa est, quæ pulmonum calamitatem sequitur, infidâque doloris mitigati specie in peripneumoniam degenerat, vt *φθίσις* in lethargum, partis affectæ *κατὰ τὴν*, vel oppressione, in quâ non tam prioris morbi mutatio fit, quam noui & longè maioris accessio. Pulmonum inflammationem cum externo thoracis musculorum consensione fieri, salutare. Fabulis quoque ægri rebus exquisita pleuritis abit in spuriam, quæ foci & purgatione profligatur: vt & illa quæ ad hypocondrium vergit. Genuinam ac suprenis partibus insidentem, quæ frequentior in dextro, deterior in sinistro latere, pessima & ferè delecteria *φθίσις*, procreat sanguis biliosus, tenuis, spumans, *ὑποπνευμονία*, raro pituitosus aut melancholicus: vnde pleuritidis, *ὀξυπνοια* non sunt obnoxij, vt necesse, nec pueri. Magna grauiorum symptomatum caterva hanc pleuritidem comitatur: febris acuta & vehemens, tertianæ in modum alternis diebus acriter sæuens: dolor *υπερπνευμονία* ad iugulum exportatus, qui repetitæ *κατὰ τὴν* venæ sectione, etiam preuentis putis apparentibus, miscefit, cathari vel mediocri exacerbat: pulsus durus, rensus, tussis primis diebus inanis & sicca, vel pulmonum compressione, vel aliunde factâ in ipsos feri tenuis & æris expressione. Haud aliter *κατὰ τὴν* singulum mouet, & crebra phlegmone lachrymas inuolutarias, ac consensionem.



VLMONIS inflammationem (à qua vt à pleuritide exercitata, coactaque corpora celeritè intereunt, quàm quæ in otio versantur) stipatam grauioribus symptomatis, quibus humor, aut aliunde accessus, aut ipsa in parte collectus procreare potest, frequentius tamen sanguinis vberitas & copia vasa pulmonis obstruentis, & horum substantiam mollem, raram, bibulam madefacientis. Porò hic putrescentes inflammati confistitque visceris edit signa certissima, stertore, *μεταίωσις*, pectoris grauitate & angustia. Idem parte aliquâ pulmonis coaceruatus, sytrophicâ parit inflammationem; quam dolor acerbior ex vestientis membranæ & pleuritæ consensu, genarum rubor, faciei moles turgida, pulsus magnus, mollis, inæqualis comitantur. Si femidior sanguis, tenuiorque bile perfusus in pulmones imrat, vel ipsorum intemperie calida, vique attractrice quâ eximia pollent, illeclus; vel hepatis aliorumque viscerum, aut venarum ætus & *υπερπνευμονία* in hos expulsus *υπερπνευμονία* parit. Hoc accensâ pulmonum membranâ, & neruorum insigni propagine è sexto pari bronchia pulmonum perreptantium, in illâ quæ per tussim & *κατὰ τὴν* fieri debet noxij humoris reiectione, dolorem acerbissimum excitat, qui lateris dolorem fodicantem ortum à pleuritide æmulatur, vt eandem dignoscendilegem, eisdemque curandi scopos subiciat.



VIVS ementitæ pleuritidis (quæ verè *ἀσπνοια* est) signa sunt: dolor stimulanis ad iugulum, omoplatas, pectus, spinam, sepiusque hinc inde productus, qui etiam immoto & quiescente thorace per sentitur: febris acutissima, *ἀσπνοια* maior: calidi spiritus expiratio, *κατὰ τὴν* *κατὰ τὴν* delirium, neruorum assistorum *εὐφροια*: pulsus durus, *περὶ πνευμονία*, omnis membranæ neruo æque partis proprius: tussis molesta, irrita, arida initio, quâ nihil *αὐτοκίνητος* excernitur, sed serosa duntaxat illuvis, calidioris biliosæ quæ humoris expressionem in arterie tubulos significans; quam tandem sequitur *κατὰ τὴν* *κατὰ τὴν* *κατὰ τὴν* cuius, vt alterius, cita & facilis reiectio, omnium thoracis affectionum genuina est & salutaris crisis. Hanc tamen non nisi abcessu rupto, & intra thoracem effuso pure, per densiorem & crassiorem pleuram fieri, vix credas. Quòd si aut copiosa expuitione, aut frequenti sanguinis eductione ex vtriusque brachij & malleoli venis, aut biliosa & copiosa alui proliuie, dolor non sedatur, *υπερπνευμονία* expectandum, à quo quidem longè maius periculi, quàm salutis augurium est: cā potissimum pulmonis parte collecto pure, quâ è directo lateris dolor pungebat, quamquam illa se perma nūit costas succingens membrana. Graue malum atque imprimis formidabile, nisi purulenta materies *κατὰ τὴν* & *κατὰ τὴν* per laryngem & os educatur, aut tota per vrinas & aluum effundatur: cuius alioqui subsistentis, maturè celebratâ lateris punctione, tentanda vacuatio.

Ergo Peripneumonia amula Pleuritidis.

214

Proponebat Lutetiæ MATHVRINVS ALTON Parisinus. A. R. S. H. M. DC. XXXI.

DOMINI DOCTORES DISPUTAVRI.

M. Nicolaus Regnier.

M. Ioannes de Bourges. *Assens. 32 f.*

M. Ludovicus Robillard.

M. Franciscus Bonjonier.

M. Ioannes Berault.

M. Claudius Lienard.

M. Iacobus Perréan.

M. Franciscus Leprieux.

M. Georgius Carnuty.

